

1. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Nome comercial	Straik Isca Mata-ratos
Registro no Ministério da Saúde	3.2340.0006
Concentração	0,005%
Ativo	Brodifacoum
Nome químico	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Fórmula molecular	C ₃₁ H ₂₃ BrO ₃
Sinónimia	PP 581
Grupo químico	Cumarínico
Chemical Abstract Service (CAS)	56073-10-0

2. APRESENTAÇÃO, INDICAÇÕES, DOSAGENS E MODO DE USO

Apresentação:	Sachês contendo 25 gramas.
Indicações	Raticida anticoagulante de dose única (segunda geração) para controle de ratos e camundongos urbanos (<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Rattus rattus</i> e <i>Mus musculus</i>) para uso em residências, escolas, fabricas de alimentos, depósitos, silos, etc.
Dosagens	A quantidade de sachês e o número de pontos de aplicação varia de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada, para ratazanas e ratos recomenda-se colocar 100 a 400 g a cada 4 a 9 metros. Para camundongos recomenda-se colocar 10 a 15 g a cada 2 a 4 metros ou 50 gramas em altas infestações.
Modo de usar	Colocar os saquinhos onde se observam sinais de presença de roedores (tocas e trilhas). Não é necessário abrir a embalagem.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS, INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS E ECOTOXICOLOGICAS

Símbolos de segurança	
DL50 aguda, oral	DL50 Oral em ratos: 0,3 mg/kg



**Ficha Técnica
Straik Isca Mata-ratos**

**Revisão 02
Nº 009
Data: 26/11/2025**

DL50 dérmica	DL50 Dérmica em coelhos: 1,25 mg/Kg (www.inchem.org)
Sensibilização dérmica	Não sensibilizante.
Irritabilidade ocular	Irritante ocular
Precauções ao meio ambiente	Contenha o vazamento ou derramamento. Não permita que o produto atinja rios, esgotos, canalizações, mananciais de água ou cursos d'água.
Prevenção da exposição do trabalhador	Evite contato do produto com a pele e com os olhos.
Precauções para manuseio seguro.	Utilize equipamentos de proteção individual.
Orientações para manuseio seguro	Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não entrar em contato direto com o produto. O produto é acondicionado em seringas aplicadores favorecendo aplicação segura.

4. INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Antídotos e tratamento	Tratamento (1) lavagem gástrica se tratamento iniciado após algumas horas da ingestão de dose única (2) Vitamina K1 10-15 mg IM ou EV muito lenta (1mg/minuto) para adultos e 0,25 mg/kg para crianças. Repetir se necessário; (3) em casos muito graves pode haver necessidade de transfusão de sangue total ou plasma; (4) monitorar tempo de pro trombina e nível de hemoglobina; (5) a seguir manter tratamento por via oral (40 mg/kg/dia adultos, 20 mg/kg/dia crianças, em doses divididas) até que tempo de pro trombina esteja normalizado pelo menos por 3 dias seguidos. Este tratamento via oral pode ter que ser continuado até por vários meses, juntamente com correção da anemia.
Telefone de emergência:	CEATOX 0800-410148
InSTRUÇÕES AO MÉDICO	Brodifacoum é um anticoagulante indireto, inibidor da atividade da Vitamina K1-epoxidase. Extremamente tóxico para roedores. É principalmente absorvido pelo trato gastrointestinal e, eventualmente, através da pele sã. Meia-vida biológica estimada em 120 dias.

5. INFORMAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Sólido/Pó
Cor	Azul



**Ficha Técnica
Straik Isca Mata-ratos**

**Revisão 02
Nº 009
Data: 26/11/2025**

Odor	Inodoro
Inflamabilidade	Produto não inflamável
Solubilidade	Baixa solubilidade em agua. Solúvel em solventes orgânicos.
Corrosividade	Produto não corrosivo para liga cobre, estanho, ferro e alumínio

6. REGISTRANTE E FABRICANTE

DEXTER LATINA Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428 – Campo Largo da Roseira

CEP: 83.090-590 – São José dos Pinhais – Paraná

Fone/ fax: (41) 3299-1900

sac@dexterlatina.com.br

www.dexterlatina.com.br

07/10/2015 – Revisão 00: Elaboração da ficha

15/06/2022 – Revisão 01: Alteração do cabeçalho

26/11/2025 – Revisão 02: Alteração do cabeçalho e inserção do histórico de revisões